

citostar

POTENCIA EL CALIBRE DE TUS FRUTOS

- ✓ Formulado líquido a base de crema de algas (*Ascophyllum nodosum*), rico en citoquininas naturales.
- ✓ Mejora el cuajado y potencia el crecimiento inicial de los frutos.
- ✓ Fruta de calibres uniformes y de buena condición de tejidos.
- ✓ Amplia compatibilidad en mezcla y equipos de aplicación.



Fabricado en España por:

Concentrado líquido de algas marinas de la especie *Ascophyllum nodosum*, rico en citoquininas naturales que estimula la división celular y el crecimiento de los frutos.

CITOSTAR® aplicado tempranamente e el desarrollo de los frutos, favorece la formación de nuevas células que determinarán el calibre final del fruto. **CITOSTAR®** en las hojas, protege la clorofila, promueve la fotosíntesis y estimula la apertura estomática.

INFORMACIÓN GENERAL



Mejora el cuajado



Aumenta el calibre



Aumenta el rendimiento



Fruta de alta calidad

COMPOSICIÓN

Materia orgánica* 34 % p/p

*Proveniente de *Ascophyllum nodosum*.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis		Momentos de aplicación
	cc/100 L	L/ha	
Vid de mesa	100-120	0,8-1,0	· Brotes de 10 - 20 cm, repetir a los 14 días.
		1,2-1,5	· Inicio crecimiento bayas, cada 7 días (2-3 aplicaciones).
Kiwi	100-120	0,8-1,0	· Brotes de 10-20 cm, repetir a los 14 días.
		1,2-1,5	· Fruto recién cuajado, hasta 20-30 DDPF.
Cerezo	120-150	1,2-1,8	· Desde plena flor, cada 7-10 días (2-3 aplicaciones).
Almendro, Ciruelo, Duraznero, Nectarín	100	1-1,5	· Desde caída de pétalos, cada 7-10 días (2-3 aplicaciones).
Manzano, Peral	100	1-1,5	· Desde caída de pétalos, cada 7-10 días (2-3 aplicaciones).
Nogal	70-100	0,8-1,0	· Desde inicios de elongación de amentos y durante el primer mes de crecimiento de los frutos.
Avellano	100	1-1,5	· A partir de octubre, cada 20-30 días (2-3 aplicaciones).
Cítricos	150-260	2,5-3,5	· 80% de los frutos con 6 a 8 mm. Repetir a los 10 días.
Tomate	100	0,5	· Cada 15 días desde inicio de cuaja.
Palto	130-150	2,5-3	· Plena flor y frutos de 10 a 20 mm.
Melón, Sandía	100-150	0,5-1	· Postransplante.
			· Desde primeros frutos cuajados, cada 7-10 días.

